Andermatt Biocontrol

Fenicur

Mode d'emploi

■ Généralités

Les matières actives de Fenicur proviennent des huiles éthérées des graines de fenouil *Oleum foeniculi*. Il est connu, de la médecine humaine, que certains composants ont des propriétés anti-oxydatives et anti-bactériennes. L'*Oleum foeniculi* est une substance utilisable dans l'alimentation, donc les résidus sur fruits et légumes sont négligeables.

■ Domaine d'application

Général

Il est important de commencer les traitements de façon préventive ou dès l'apparition des tous premiers symptômes. Fenicur peut être appliqué à l'aide des pompes à traiter usuelles. Traiter avec une pression faible à moyennes pour favoriser une bonne couverture avec le produit.

Petits fruits

Groseilles à maquereau, groseilles, cassis:
Oïdium, rouille (effet partiel)
0,4 % (4 l/ ha), 3 à 5 x de façon préventive tous les 7 à 10 jours; 1er traitement peu après le débourrement.
La concentration indiquée se base sur une application de 1000 l/ ha (Groseilles et groseilles à maquereau du stade mise à fruits présents à 50-90%, volume de culture de 7.500 m³/ha)

Cultures maraîchères

Cucurbitacées (cultures sous abris), tomates
Oïdium (effet partiel)
0,4%, de façon préventive selon pression de la maladie, tous les 7 à 10 jours.

Plantes ornementales

Oïdium, rouille (effet partiel)
0,4%, de façon préventive selon pression de la maladie, tous les 7 à 10 jours.

Viticulture

0,4%, de façon préventive selon pression de la maladie, traitements pré- est post-floraux tous les 7 à 10 jours jusque' à mi-août au plus tard.

Phytotoxicité sur pantes ornementales

Généralement, Fenicur est très bien toléré par les plantes. Avant de traiter un nombre important de plantes il faut faire un essai d'application sur quelques plantes. Sur les cultures suivantes il peut y avoir des incompatibilités :
Poinsettias (après formation des bractées)

■ Préparation de la bouillie

Remplir le réservoir avec 1/3 d'eau; ajouter le Fenicur; compléter avec le solde de l'eau et bien mélanger.

■ Délai d'attente

Petits fruits : 3 semaines
Cultures maraîchères : 3 jours

■ Miscibilité

Fenicur est miscible avec Microperl (Cuivre) et Armicarb. Ne pas mélanger avec du soufre, Genol Plant et Mycosin.

■ Manipulation

Pendant la préparation, ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer. Après emploi se laver les mains avec du savon. Veiller à une bonne ventilation/aspiration au poste de travail.

■ Transport

UN 3082 Substance dangereuse pour l´environnement, liquide (Dipenten, (R)-p-Mentha-1,8-dien), 9, III

■ Stockage

Stocker à température ambiante. Tenir à l'abri du gel.

■ Elimination

Rincer soigneusement les bidons vides et les jeter aux ordures ménagères. Les restes de produits phytosanitaires doivent être déposés au lieu de collecte communal, dans un lieu de collecte pour déchets spéciaux ou rapportés au point de vente.

■ Responsabilité

Andermatt Biocontrol SA décline toute responsabilité en cas de dégât sur les cultures dus au non respect du mode d'emploi.

■ Premiers secours

Après inhalation:
Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.
Après contact avec la peau:
Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer. Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.
Après contact avec les yeux:
Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières et consulter un médecin.
Après ingestion:
Rincer la bouche et boire ensuite abondamment.
Si les troubles persistent, consulter un médecin.
Indications destinées au médecin:
Traitement symptomatique (décontamination, fonction vital), aucun antidot connu.